

HZJZ: preporuke za docjepljivanje trećom dozom cjepiva protiv covid-19

Kategorija: VIJESTIAžurirano: Utorak, 12 Listopad 2021 19:05

Objavljeno: Utorak, 12 Listopad 2021 19:05

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je u utorak preporuke za primjenu treće doze cjepiva protiv covid-19 u imunokompromitiranih osoba i docjepljivanje trećom dozom osoba koje su završile primarno cijepljenje, što je od danas moguće u Hrvatskoj.

Davanje treće doze cjepiva preporučuju se određenim kategorijama imunokompromitiranih osoba, kao dodatna dozu onima za koje je pretpostaviti da nisu razvile potpuni ili zadovoljavajući imunološki odgovor na cjepivo. O vremenu kada je treća doza potrebna odlučuje liječnik specijalista koji osobu liječi.

Za razliku od dodatne doze, docjepna booster doza je doza cjepiva koja se primjenjuje s većim vremenskim odmakom od primarne serije cijepljenja, kako bi se produžila duljina trajanja zaštite protiv virusa.

Stoga se docjepljivanje preporučuje korisnicima domova za starije i nemoćne osobe i odrasle osobe s invaliditetom, radnicima zaposlenim kod pružatelja usluge smještaja za starije i nemoćne osobe i odrasle osobe s invaliditetom, i kod drugih pružatelja usluge smještaja te zdravstvenim radnicima koji izravno skrbe o pacijentima, zdravstvenim radnicima te svim osobama u dobi 65 i više godina,

Cijepljenje trećom dozom preporučuje se i svim osobama u dobi od 18 i više godina koje dijele kućanstvo s imunokompromitiranim i izrazito osjetljivim osobama te svim osobama u dobi 18 i više godina koje boluju od kroničnih bolesti koje uvećavaju rizik za teže oblike covid-19, navodi HZJZ.

Uzimajući u obzir specifičnosti zdravstvenog stanja kao i obiteljskog i radnog okruženja koji mogu biti važni u donošenju odluke o cijepljenju, sve osobe u dobi 18 i više godina u kojih je proteklo najmanje 6 mjeseci nakon završetka primarnog cijepljenja mogu se docijepiti nakon konzultacije s liječnikom.

Osobama koje su preboljele covid-19 te su nakon preboljenja započele i završile primarno cijepljenje, nije potrebna treća doza, poručuju iz HZJZ-a.

Za docjepljivanje se preporučuje cjepivo Comirnaty (Pfizer) i to minimalno šest mjeseci nakon završetka primarnog cijepljenja, s obzirom da je Europska agencija za lijekove (EMA) dala odobrenje za primjenu docjepne doze samo za to cjepivo.

"Za osobe koje su se primarno cijepile drugim cjepivima, docjepljivanje cjepivom Comirnaty izlazi izvan odobrenih indikacija, tj. radi se o off-label primjeni koju smatramo opravdanom na temelju dostupnih medicinskih znanja. Očekuje se uskoro i ocjena primjene treće doze cjepiva Spikevax (Moderna) te ćemo u skladu s ocjenom revidirati ove preporuke", ističu u HZJZ-u

Za docjepljivanje i primjenu treće doze građani mogu koristiti sve dostupne kanale cijepljenja kao i za primarno cijepljenje: punktove za cijepljenje bez najave, izabranog liječnika obiteljske medicine ili pak cijepljenje na licu mjesta (domovi za starije osobe, zdravstvene ustanove za zdravstvene radnike itd).

U HZJZ-u napominju kako je prioritet cijepiti se s dvije doze (odnosno jednom u slučaju

HZJZ: preporuke za docjepljivanje trećom dozom cjepiva protiv covida-19

Kategorija: VIJESTIAžurirano: Utorak, 12 Listopad 2021 19:05

Objavljeno: Utorak, 12 Listopad 2021 19:05

Janssenova cjepiva) za one osobe koje se još nisu cijepile. (Hina)

