

Troje ljudi u Hrvatskoj zaraženo virusom Zapadnog Nila

Kategorija: VIJESTIAžurirano: Ponedjeljak, 24 Kolovoz 2026 15:51

Objavljeno: Ponedjeljak, 24 Kolovoz 2026 15:51

Tri osobe u Hrvatskoj oboljele su nakon zaraze virusom Zapadnog Nila tijekom srpnja i kolovoza, potvrdili su za [RTL Danas](#) iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Oboljeli stižu iz istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Iz HZJZ-a izričito navode da se bolest ne prenosi kontaktom s čovjeka na čovjeka. Objavili su i detaljno objašnjenje o bolesti.

"Bolest Zapadnog Nila je vektorima prenosiva bolest, čiji je uzročnik virus zapadnog Nila, koji se u prirodi održava u ciklusu između ornitofilnih komaraca i ptica. Ptice su glavni domaćini virusa. Virus se umnožava u pticama koje su glavni izvori infekcije. Na krajnje slučajne domaćine: ljude, kopitare ili druge sisavce, virus se prenosi ubodom zaraženog komarca (vektora). To su prvenstveno komarci roda Culex, (vrste Culex pipiens), a mogu ga eventualno iznimno prenijeti i druge vrste iz roda Aedes", ističu iz HZJZ-a.

Simptomi nalik gripi

Navode da je riječ o sezonskoj bolesti, koja ovisi o brojnim okolišnim, klimatskim i vremenskim prilikama, pa čak i o broju i aktivnosti komaraca i ptica. No, uglavnom se pojavljuje u ljetnim i ranim jesenskim mjesecima. Objašnjavaju i koji simptomi prate tu bolest.

Infekcija virusom Zapadnog Nila u ljudi nakon inkubacije od 2-6 dana (u rasponu od 2-14) najčešće prolazi bez simptoma ili asimptomatski (u približno 70-80 posto slučajeva). U oko 20-30 posto inficiranih manifestira se kao akutna sistemska febrilna bolest praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima, zglobovima, simptomima od strane gastrointestinalnog sustava. Može se pojaviti prolazni makulopapulozni osip (u 25-50 posto oboljelih). Radi se o relativno blažem obliku bolesti koji se naziva groznica Zapadnog Nila, čiji simptomi nalik gripi traju od dva do pet dana.

U manje od jedan posto inficiranih može se razviti teži oblik bolesti uslijed zahvaćenosti središnjeg živčanog sustava, sa simptomima meningitisa/upale moždanih ovojnica, encefalitisa i vrlo rijetko akutne mlohave klijenuti. Pod povećanim su rizikom za razvoj težeg oblika bolesti starije osobe koje već imaju postojeću kroničnu bolest kao npr. kroničnu bubrežnu bolest, dijabetes, hipertenziju ili imunosuprimirane osobe (kao npr. transplantirani i sl.)", navode iz HZJZ-a.

Naglašavaju da se oboljeli liječe simptomatski i da se uglavnom oporave bez trajnih posljedica. Dodaju da su u prevenciji zaraze važne mjere suzbijanja komaraca, koji su aktivni u sumrak ili tijekom noći i zore, te osobne mjere zaštite:

Primjenjujte sredstva koja odbijaju komarce, tzv. repelente u spreju na kožu (prema uputama proizvođača)

Zaštitite se odjećom dugih rukava i nogavica tijekom boravka na području s puno komaraca (osobito u sumrak)

Zaštitite prozore i vrata balkona ili terasa mrežama protiv insekata

Koristite sredstva koja odbijaju komarce, tzv. repelente za prostore

Boravite u klimatiziranim prostorima kada je moguće. (iPress)

Troje ljudi u Hrvatskoj zaraženo virusom Zapadnog Nila

Kategorija: VIJESTIAžurirano: Ponedjeljak, 24 Kolovoz 2026 15:51

Objavljeno: Ponedjeljak, 24 Kolovoz 2026 15:51

